

與癌症藥物治療相關皮疹的**多樣性**

- **粘膜炎**
- **過度脫髮（脫髮）**
- 乾燥症
- 肢端紅斑
- 化療毒性紅斑
- 光敏性（對陽光的敏感性增加）
- 放射性皮炎
- 回憶反應

針對新發皮膚病的癌症患者的處理方法：


I. 識別模式


II. 考慮原因

- 與原發癌症或抗癌治療無直接關係的常見皮膚病
- 藥物相關：抗癌藥、其他藥物（中藥、保健品）
- 感染：普通感染與機會性感染
- 癌症相關

癌症相關的口腔粘膜炎

- 100% 化療+放療
- 20-50% 常規化療
- 10-36% 靶標治療
- 口腔衛生治療前差 (化療前向牙醫查詢，或口腔頷臉牙科醫生)
- 維持時間視乎治療持久度
- 少有嚴重症狀
- 口腔灼痛和紅斑、疼痛、糜爛和潰瘍
- 繼發性感染
- 味覺障礙
- 惡病質 (Cancer Cachexia)





口瘡

心脾積熱

周圍鮮紅、數目多散在
灼熱疼痛，進食加重
口渴口臭、舌紅苔黃
脈數

涼膈散

大黃、芒硝、黃芩
梔子、甘草、薄荷

陰虛火旺

潰點少, 1-2片, 反覆發作
口渴不欲飲, 納呆, 口臭
舌紅少苔, 脈數

沙參麥冬湯

沙參、麥冬、玉竹、甘
草、桑葉、扁豆、天花
粉

脾胃積熱

單個或數個淡黃色潰點 周圍水腫充
血, 觸痛, 納呆, 口乾不欲飲, 口臭

瀉黃散

藿香、梔子、石膏、甘
草、防風

熱毒傷陰

上皮細胞脫皮, 全個口腔潰爛
口咽乾燥, 不能進食

大黃黃連瀉心湯

大黃、黃連、生甘草、

60例鼻咽癌隨機分為2組

口炎清組（30例）放射治療前開始至 對照組(維生素B，Lidocaine, Dexamethasone)（30例）

口炎清組: 12.40天

對照組: 9.46天


瀉合谷 - 強刺激

補三陰交 - 輕刺激



National Comprehensive Cancer Network (NCCN) vs Opioid

- 美國國立綜合癌症網路
- 11個臨床指南中
- 5個中建議癌症相關症狀使用針灸 (生存、舒緩、疲累、成人癌痛、嘔吐)



NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines™)

Adult Cancer Pain

Version 2.2011



NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines™)

Survivorship

Version 1.2013



NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines™)

Cancer-Related Fatigue



NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines™)

Antiemesis

Version 1.2014

NCCN.org



NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™


Palliative Care

Continue

www.nccn.org

NCCN.org

中醫藥治療腫瘤的作用



Clinical Practice Guidelines of Chinese Medicine in Oncology
 China Association of Chinese Medicine
 Incorporated with National Comprehensive Cancer Network

